

PROTOCOLO DE ENSAYO: SATURNINO MARÍA LASPIUR

15.000 kg/ha en
Suelos Clase IV y VI.

El impacto de MAXAN en la expresión
del potencial de maíz.

Parámetros del Ensayo



Ubicación

Saturnino María Laspiur.
Est. Coassolo Neldo.



Condición Edáfica

Suelo Franco Limoso.
Clasificación: Clase IV y VI
WWS (Suelos con limitantes).



Tratamiento

30 lt/ha de MAXAN.
Momento de aplicación:
Barbecho presiembra de maíz.



Genética

Maíz Albert 8850 VIP (ref.
parcela 8004 VIP 3 Bioseed).


EVIDENCIA DE COSECHADORA

TESTIGO SIN
MAXAN

Línea de corte del ensayo.
Arriba: Testigo.
Abajo: Sector tratado con
MAXAN en barbecho.

TESTIGO SIN
MAXAN

Análisis Espacial: Decodificando el Mapa



Zonas de rinde inferior/testigo.



Sectores MAXAN.
Correlación directa
con la aplicación.

Los sectores Verde Oscuro (tratados) alcanzaron picos de **14.500** a **15.000** kg/ha.

Matriz de Impacto: El Salto Cuantitativo

Promedio General (Sin optimizar)

10.111
kg/ha



Sectores MAXAN (Tratado)

Hasta
15.000
kg/ha


El promedio del lote se ve arrastrado por las limitantes del suelo franco limoso. La zona tratada expresa el potencial real de la genética.

Mecanismo de Acción: Rompiendo el Techo de Rinde

La aplicación de 30 lt/ha en barbecho presiembra actúa como acondicionador estratégico.

Optimiza la dinámica del suelo franco limoso (Clase IV/VI), mitigando sus limitantes físicas e hídricas.

Transforma un ambiente restrictivo en un entorno capaz de sostener rendimientos de élite.



MAXAN
MEJORADOR DE SUELOS



Redefiniendo los límites del lote.

MAXAN no solo mejora el suelo; asegura que la inversión en genética exprese su máximo potencial, incluso en las condiciones más desafiantes.

Ensayo Laspiur - Agricultura de Precisión.